

## 艾力达简介

Levitra 中文商标：艾力达。是一粒橙色的小药丸，绰号“火焰”。是德国拜耳医药保健有限公司生产的新一代“伟哥”。它是非常强效的 PDE-5 抑制剂，且“起效迅速、勃起硬度高、安全无依赖”，能够让伴侣双方“共同抓住激情时刻”！



### 艾力达功效

1.艾力达—强效、高选择性的 PDE5 抑制剂 与万艾可和希爱力相比，艾力达的药效最强，治疗选择性最高。

2.艾力达起效迅速 艾力达 10 分钟即可起效，大多数男士服用 25 分钟内起效，是同类产品中起效最快的，能令患者对自己的性功能充满信心

3.艾力达药物时间窗合理 绝大多数的艾力达使用者首次使用用药就能得到满意的效果，而且药效可长达 12 小时。从当天傍晚到第二天清晨一直可以拥有完美的性生活。

4.艾力达长期可靠有效 经研究证实，艾力达不仅药效持久，而且长期服用艾力达的患者性交成功的比率高于 90%。

5.艾力达勃起硬度好 艾力达能让患者勃起更容易，硬度更高，明显优于其他同类产品。因此有接近半数的患者最喜欢艾力达。

6.艾力达是糖尿病 ED 患者的最佳选择 艾力达对糖尿病合并 ED 的治疗效果非常显著，有超过 70%的此类患者服药后勃起得到明显改善。

7.艾力达对万艾可(伟哥)无效的患者有效艾力达对使用万艾可(伟哥)无效的患者同样有效，有超过 60%的此类患者在服用艾力达之后表现出了明显的效果。

8.艾力达 显著改善伴侣双方性交满意度 最近完成的一项研究表明，在使用艾力达治疗 12 周之后，ED 患者伴侣双方均对艾力达的治疗感到满意，艾力达提高了伴侣双方对勃起功能、性交和性高潮的满意度，增强了他们对自己性功能的信心。

9.艾力达 具有良好的耐受性 艾力达有良好的耐受性，不良反应大多很轻微，通常会在短时间内消失。

### 艾力达服用说明

【药品名称】通用名:盐酸伐地那非片。商品名:艾力达。英文名: Vardenafil Hydrochloride Tablet.

【适应症】治疗男性阴茎勃起障碍。

【用法用量】用法：口服；用量：推荐开始剂量为 10mg，在性交之前 30-60 分钟服用。最大剂量推荐使用频率为一日一次。需要性刺激作为本能的反应进行治疗。根据药效和耐受性，剂量可增加到 20mg 或减少到 5mg。最大推荐剂量是每日一片。轻度肝损的患者，不

需调整剂量；中度肝损害的患者建议始剂量为 5mg；轻度、中度或重度肾损害的患者均无需调整剂量。

如何鉴别真假艾力达

目前很多人反映，艾力达的效果比伟哥的效果好，而且反作用小很多，所以这段工夫卖艾力达的人特别多

。由于假药的利润十分高，招致如今市面上有很多假艾力达，来冒充出口的艾力达。下面给大家引见正品艾力达与其冒充品的区分：

第一，经过外包装，正品艾力达普通是 20mg，有 4 粒装和 30 粒瓶装，假药普通包装混乱，甚至呈现中文艾力达字样并不会呈现任何反响，但在 12 个小时之内，稍有异性安慰就会发作勃起

第二，经过效果，国人对壮阳药品有一个误区，以为吃了艾力达或许伟哥就立刻勃起数小时，这是完全错误的了解，艾力达可以协助男性成功勃起，但必需树立在异性安慰上。第三，经过颗粒颜色，正品艾力达呈橙色，圆形，制造工艺较为细致，假药普遍是小作坊生产，经过手感可以分辨出来。

### 安全性与副作用

【禁忌】对药物的任何成份（活性或非活性成份）有过敏症状的患者禁用。PDES 抑制剂可能增强硝酸盐类

药物的降压效果。因此，服用亚硝酸盐类或一氧化氮供体治疗的患者避免同时使用伐地那非。

【注意事项】由于性活动伴有一定程度的心脏危险性，故医生对患者勃起功能障碍采取任何治疗之前，应首先考虑其心脏状况。由于潜在的心脏危险性，不推荐心脏病患者进行性交。因此通常不能使用治疗勃起功能障碍的药物。联合使用其它治疗勃起功能障碍的方法时，伐地那非的安全性和疗效尚未研究，因此不推荐联合使用！对于下列情况的患者，伐地那非的安全性尚未研究，除非有进一步的资料才推荐使用伐地那非：严重肝病，需要透析的晚期肾病，低血压（静息收缩压 $\leq 90$ mmHG），近期患有脑卒中或心肌梗死（6 个月内），不稳定型心绞痛，家族退行性眼部疾病，如色素性视网膜炎。伐地那非不适儿童和青少年（出生至 16 周岁）。

【不良反应】发生率 $\leq 10\%$ ；头痛、颜面潮红 1%；消化不良、恶心、眩晕、鼻炎。

【规格】 4 粒\*20mg /盒 30 粒\*20mg /瓶 两种规格

【生产厂商】德国拜耳医药保健有限公司

### 艾力达成份

德国艾力达的主要成份是盐酸伐地那非，化学名为：2-[2-乙氧基-5-(4-乙基-哌嗪-1-磺胺基)-苯基]-5-甲基-7-丙基-3H-咪唑 [5,1-f]-[1,2,4] 三联氮-4-酮单盐酸盐。分子式： $C_{23}H_{32}N_6O_4S \cdot HCl \cdot 3H_2O$ ，分子量：579.1。本品为浅橙色至暗橙色的薄膜衣片，除去薄膜衣后显白色。

### Important Safety and Dosing Information

LEVITRA (vardenafil HCl) is a prescription medicine that is used to treat erectile dysfunction (ED). Men taking nitrate drugs, often used to control chest pain (also known as angina), should not take LEVITRA. Such combinations could cause blood pressure to drop to an unsafe level. As with all ED drugs, there is a rare risk of an erection lasting longer than four hours. To avoid long-term injury, seek immediate medical attention. LEVITRA does not protect against sexually transmitted diseases. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile dysfunction medicine, including LEVITRA) reported a sudden decrease or loss of vision in one or both eyes, or a sudden decrease or loss in hearing, sometimes with ringing in the ears and

dizziness. It is not possible to determine whether these events are related directly to these medicines or to other factors. If you experience any of these symptoms, stop taking PDE5 inhibitors, including LEVITRA, and call a doctor right away.

Discuss your medical conditions, including heart problems, and medications, including alpha blockers prescribed for prostate problems or high blood pressure, with your doctor to ensure LEVITRA is right for you and that you are healthy enough for sexual activity. LEVITRA is not recommended for men with uncontrolled high blood pressure.

The starting dose of LEVITRA is 10 mg taken no more than once per day. Your doctor will decide the dose that is right for you. In patients taking alpha blockers, your doctor may start you on a lower dose of LEVITRA. In patients taking certain medications such as ritonavir, indinavir, saquinavir, atazanavir, ketoconazole, itraconazole, erythromycin and clarithromycin, lower doses of LEVITRA are recommended, and time between doses of LEVITRA may need to be extended. In clinical trials, the most commonly reported side effects were headache, flushing, and stuffy or runny nose. LEVITRA is available in 2.5-mg, 5-mg, 10-mg, and 20-mg tablets.

You are encouraged to report negative side effects of prescription drugs to the FDA.

Visit [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch), or call 1-800-FDA-1088.

Please see complete Prescribing Information, which includes the patient information, for 2.5-mg, 5-mg, 10-mg, and 20-mg

LEVITRA® (vardenafil HCl).

[Requires Adobe® Reader® - [click here to download](#)]

更多资料请参考: <http://www.seo212.cn>